AKI UniversitätsSpital Zürich
Klinik für Immunologie
Diagnostik Allergologie Klinische Immunologie (AKI)
Akkreditiert nach ISO/IEC 17025, ISO 15189, (STS 0227)
Rämistrasse 100 OPS E 4, 8091 Zürich Tel: 044 255 12 00 Fax: 044 255 12 11

Immunglobuline, Komplement, Entzündungsfaktoren, α1-Antitrypsin, Liquorrhoe, Tumormarker, Zytokine

externe Referenznummer

Patienten-Etikette oder Patienten-Angaben

Name:
Vorname:
Geschlecht:
Geburtsdatum:
Strasse:
PLZ/Ort:

Abnahme-Datum T T M M J J J J

Abnahme-Zeit H H M M

Arztnummer

Arzt-Suchernr.

Tel. Station

Nachbestellung von Auftragsformularen
- ☐ 10 Stück
- ☐ 20 Stück
- ☐ 50 Stück

Rechnung an:
- ☐ Patient
- ☐ Auftraggeber
- ☐ Drittzahler

☐ Befundkopie an:

Serum	EDTA	Urin	BAL
CITRAT	Liquor	Punktat	

Markierung
Richtig ☐
Falsch ☒

Einsendercode Auftraggeber

Immunglolobuline
- ☐ IgG Serum
- ☐ IgG Urin
- ☐ IgG Liquor
- ☐ IgG-Subklassen inkl. IgG total Serum
- ☐ IgA Serum
- ☐ IgA Urin
- ☐ IgM Serum
- ☐ IgD Serum
- ☐ IgE Serum

bei IgA-Mangel
- ☐ anti-IgA

Impfantwort
- ☐ Anti-Pneumokokken IgG2 (Polysaccharid-AK)

Komlementsystem
- ☐ Komplementgesamtaktivität (klassischer, alternativer und MBL-Weg)

-> Hinweis: Serum muss gefroren geschickt werden, auf Trockeneis bei -70°C
- ☐ Komplementfaktor C3
- ☐ Komplementfaktor C4
- ☐ C1-Esterase-Inhibitor quantitativ
- ☐ C1-Esterase-Inhibitor funktionell

-> Hinweis: Bestimmung zusammen mit C4 sinnvoll

Zirkulierende Immunkomplexe
- ☐ C3d-enthaltende Immunkomplexe
- ☐ C1q-bindende Immunkomplexe

Gammopathie-Diagnostik
- ☐ Suchtest monoklonale Gammopathie: Immunfixation, IgG/A/M, freie Leichtketten λ und κ
- ☐ Immunfixation, IgG/A/M, freie Leichtketten λ und κ mit Ratio
- ☐ Immunfixation, IgG/A, Leichtketten λ und κ mit Ratio
- ☐ freie Leichtketten λ und κ inkl. Ratio
- ☐ Leichtketten: Menge im 24 h-Urin

Urinmenge in 24 h: _____

- ☐ β-2 Mikroglobulin Serum
- ☐ β-2 Mikroglobulin Urin

Entzündungsfaktoren
- ☐ CRP (sensitiv)
- ☐ Neopterin

α1-Antitrypsin
- ☐ α1-Antitrypsin (AT) quantitativ
- ☐ α1-Antitrypsin Phänotypisierung inkl. α1-AT quantitativ

α1-AT Menge: _____ **g/l**

-> ohne Angabe erfolgt die Bestimmung bei uns

Liquorrhoe
- ☐ β2-Transferrin
- ☐ β2-Transferrin

Tumormarker
- ☐ β-Mikroglobulin
- ☐ Thymidinkinase
- ☐ S100B (Melanom)

Zytokine
- ☐ Interleukin-1β Serum
- ☐ Interleukin-1β Liquor
- ☐ Interleukin-2 Serum
- ☐ Interleukin-2 Liquor
- ☐ löslicher Interleukin-2 Rezeptor Serum
- ☐ löslicher Interleukin-2 Rezeptor Liquor
- ☐ Interleukin-6 Serum
- ☐ Interleukin-6 Liquor
- ☐ Interleukin-6 BAL
- ☐ Interferon-γ Serum
- ☐ Interferon-γ Liquor
- ☐ Interferon-γ BAL
- ☐ TNF-α Serum
- ☐ TNF-α Liquor
- ☐ TNF-α BAL
- ☐ Interleukin-8 Serum
- ☐ Interleukin-8 Liquor
- ☐ Interleukin-8 BAL
- ☐ Interleukin-10 Serum
- ☐ Interleukin-10 Liquor
- ☐ Interleukin-12 Serum
- ☐ Interleukin-12 Liquor

Kryoglobuline
- ☐ Kryopräzipitat-Typ
- ☐ Kryopräzipitat quantitativ

-> spezielle Präanalytik: Serum und EDTA-Blut muss bis zur Zentrifugation strikt bei 37-39°C gehalten werden; 2 Serumröhrchen und 1 EDTA-Röhrchen ganz gefüllt notwendig

Bitte jedes Röhrchen nach Blutentnahme 5 mal sorgfältig kippen!

Labornummer

010130050129